

EXERCICE 1 : 1. Calcul de $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} \frac{(1+x) - \ln(1+x)}{(1+x)^2} = 1 - \frac{1 - \ln(1+x)}{(1+x)^2} = \frac{(1+x)^2 - 1 + \ln(1+x)}{(1+x)^2}$ pour

tout x de l'intervalle $] -1 ; +\infty[$.

2. Pour tout x de l'intervalle $] -1 ; +\infty[$, on pose $N(x) = (1+x)^2 - 1 + \ln(1+x)$.

a) La fonction N est dérivable sur $] -1 ; +\infty[$ comme somme et composée de fonctions dérivables sur $] -1 ; +\infty[$.

$N'(x) = 2(1+x) + \frac{1}{1+x} = \frac{2(1+x)^2 + 1}{1+x} > 0$ sur $] -1 ; +\infty[$. Donc la fonction N est strictement croissante sur $] -1 ; +\infty[$.

b) $N(0) = 1 - 1 + \ln 1 = 0$. Comme la fonction N est strictement croissante sur $] -1 ; +\infty[$, alors N est négative sur $] -1 ; 0]$ et

positive sur $[0 ; +\infty[$. On sait que $f'(x) = \frac{(1+x)^2 - 1 + \ln(1+x)}{(1+x)^2} = \frac{N(x)}{(1+x)^2}$ qui est du signe de N sur $] -1 ; +\infty[$. Donc la

fonction f est décroissante sur $] -1 ; 0]$ et croissante sur $[0 ; +\infty[$.

3. a) La droite D d'équation $y = x$ est asymptote oblique à la courbe C en $+\infty$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$.

Or, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x}$. En posant $X = 1+x$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln(X)}{X} = 0$ (résultat du

cours). Donc la droite D d'équation $y = x$ est asymptote oblique à la courbe C en $+\infty$.

b) L'abscisse du point d'intersection de la courbe C et de la droite D vérifie l'équation $f(x) = x$, soit $\frac{\ln(1+x)}{1+x} = 0$,

soit $\ln(1+x) = 0$, soit $1+x = 1$, soit $x = 0$. Comme $f(0) = 0$, le point $O(0; 0)$ est le point d'intersection de la courbe C et de la droite D .

4. a) La fonction F est dérivable sur $[0 ; +\infty[$ comme composée de fonctions dérivables sur $[0 ; +\infty[$.

Pour tout réel positif x , F est de la forme u^2 de dérivée $2uu'$, donc $F'(x) = 2\ln(1+x) \frac{1}{1+x} = 2 \frac{\ln(1+x)}{1+x}$.

Ainsi, une primitive de la fonction f est $G(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} [\ln(1+x)]^2 + k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

b) $\int_0^3 f(x) dx = G(3) - G(0) = \frac{3^2}{2} - \frac{1}{2} [\ln(1+3)]^2 - (0 - \frac{1}{2} [\ln(1+0)]^2) = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} [2\ln 2]^2 = \frac{9}{2} - 2(\ln 2)^2$.

EXERCICE 2 :

On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = x \ln(x+1)$ et C sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. a) La fonction f est dérivable sur $[0 ; +\infty[$ comme produit et composée de fonctions dérivables sur $[0 ; +\infty[$.

$f'(x) = \ln(x+1) + x \frac{1}{1+x} = \ln(x+1) + \frac{x}{1+x}$. Pour $x \in [0 ; +\infty[$, $\ln(x+1) \geq 0$ et $\frac{x}{1+x} \geq 0$. Donc, pour $x \in [0 ; +\infty[$,

$f'(x) \geq 0$, et f est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

b) L'axe des abscisses est tangent à la courbe C au point O si le nombre dérivé de f en 0 est égal à 0 .

Or, $f'(0) = \ln(1) + 0 = 0$, donc l'axe des abscisses est bien tangent à la courbe C au point O .

2. a. Pour tout réel $x \neq -1$, $ax + b + \frac{c}{x+1} = \frac{(ax+b)(x+1)+c}{x+1} = \frac{ax^2+(a+b)x+b+c}{x+1} = \frac{x^2}{x+1}$. Les dénominateurs

sont égaux, donc les numérateurs doivent être égaux, et par identification, on obtient $a = 1$, $a + b = 0$ et $b + c = 1$, soit

$a = 1$, $b = -1$ et $c = 1$. Ainsi, pour tout réel $x \neq -1$, $\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$.

b. D'où $I = \int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \int_0^1 (x - 1 + \frac{1}{x+1}) dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 - 0 = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

3. L'aire A du domaine plan délimité par la courbe C , les droites d'équation $x = 0$, $x = 1$ et l'axe des abscisses est égale à

l'intégrale $J = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x \ln(x+1) dx$. On pose $u(x) = \ln(x+1)$ et $v'(x) = x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x+1}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.


$$D'où J = \int_0^1 f(x) dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln(x+1) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2(x+1)} dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(x - \frac{1}{x+1} \right) dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}.$$

EXERCICE 3 : Une maladie est apparue dans le cheptel bovin d'un pays. Elle touche 0,5 % de ce cheptel (ou 5 pour mille).

1. On choisit au hasard un animal dans le cheptel. La probabilité qu'il soit malade est égale à 0,005.

2. On sait que la probabilité qu'un animal ait un test positif à cette maladie sachant qu'il est malade est 0,8. Lorsqu'un animal n'est pas malade, la probabilité d'avoir un test négatif est 0,9. On note T l'évènement « avoir un test positif à cette maladie » et M l'évènement « être atteint de cette maladie ».

a. L'arbre pondéré les données de l'énoncé :



b. Pour calculer la probabilité de l'évènement T on utilise la formule des probabilités

$$\text{totales : } p(T) = p(T \cap M) + p(T \cap \bar{M}) = p_M(T)p(M) + p_{\bar{M}}(T)p(\bar{M}) =$$

$$0,8 \times 0,005 + 0,1 \times 0,995 = 0,1035.$$

c. La probabilité qu'un animal soit malade sachant que le test est positif est définie par

$$p_T(M) = \frac{p(M \cap T)}{p(T)} = \frac{0,8 \times 0,005}{0,1035} \approx 0,0386.$$

EXERCICE 4 : Un jeu consiste à miser un euro, puis à lancer deux fois un dé cubique équilibré. Si le joueur obtient un 6, il gagne 5 euros, et s'il obtient deux 6, il gagne 10 euros.

Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

1. Le joueur peut gagner 0, 5 ou 10 euros. Comme il mise 1 euro, les valeurs prises par X sont -1, 4 et 9.

$$2. p(X = -1) = p(\text{obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5 aux deux lancers}) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}.$$

$$p(X = 4) = p(\text{obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5 à un lancer et 6 à l'autre}) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{10}{36}.$$

$$p(X = 9) = p(\text{obtenir 6 aux deux lancers}) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}. \text{ On vérifie que } p(X = -1) + p(X = 4) + p(X = 9) = 1.$$

$$3. \text{L'espérance mathématique de X est égale à } E(X) = -1 \frac{25}{36} + 4 \frac{10}{36} + 9 \frac{1}{36} = \frac{-25 + 49}{36} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}.$$